

### №3-дәріс.

#### Тақырыбы: Квадраттық иррационалдықты интегралдау.

##### Кейбір иррационал өрнектерді интегралдау.

Рационал емес функциялардың интегралдарын айнымалыны ауыстыру арқылы рационал функцияларға келтіруге болатын жағдайларды қарастырамыз.

**1-жағдай.**  $\int R\left(x, \sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$  есепте, мұндағы  $a, b, c, d$  – тұрақты сандар,  $m$  – натурал сан,  $ad-bc \neq 0$ ,  $R(x, y)$  – рационал функция.

$t^m = \frac{ax+b}{cx+d}$  белгілеуі интеграл астындағы өрнекті рационал функцияға әкелетіндігін

көрсетеміз. Шынында да,  $x = \frac{b-dt^m}{ct^m-a}$ ,  $dx = \frac{mt^{m-1}(ad-bc)}{(ct^m-a)^2} dt$  болғандықтан,

$\int R\left(x, \sqrt[m]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx = \int R\left(\frac{b-dt^m}{ct^m-a}, t\right) \frac{mt^{m-1}(ad-bc)}{(ct^m-a)^2} dt = \int R_1(t) dt$ , мұндағы  $R_1(t)$  – рационал функция.

*Мысал 1.*  $\int \frac{1}{(x-1)^2} \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} dx$  интегралын есепте.

Мынадай белгілеу енгіземіз:  $t^3 = \frac{x+1}{x-1}$ ,  $x = \frac{t^3+1}{t^3-1}$ ,  $dx = \frac{-6t^2 dt}{(t^3-1)^2}$ ,  $x-1 = \frac{2}{t^3-1}$ ,

нәтижесінде:

$$\int t \frac{-6t^2}{(t^3-1)^2} \cdot \frac{(t^3-1)^2}{4} dt = -\frac{3}{2} \int t^3 dt = -\frac{3}{8} t^4 + C = -\frac{3}{8} \cdot \frac{x+1}{x-1} \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} + C.$$

Бұл түрдегі интегралдарға  $\int R(x, x^{\frac{m_1}{n_1}}, x^{\frac{m_2}{n_2}}, \dots) dx$  интегралы да жатады,  $x = t^k$  белгілеуінің арқасында интеграл астындағы өрнек рационал функцияға келеді, мұндағы  $k$  – барлық  $x$  бөлшек көрсеткіштерінің ортақ бөлімі.

*Мысал 2.*  $\int \frac{1+\sqrt[4]{x}}{x+\sqrt{x}} dx$  тап. Мынадай белгілеу енгізсек:  $x = t^4$ ,  $dx = 4t^3 dt$ ,

$$\int \frac{1+t}{t^4+t^2} 4t^3 dt = 4 \int \frac{t^2+t}{t^2+1} dt = 4 \int \left(1 + \frac{t-1}{t^2+1}\right) dt = 4 \left(\int dt + \int \frac{tdt}{t^2+1} - \int \frac{dt}{t^2+1}\right) = 4t + 2 \ln(t^2+1) - 4 \operatorname{arctg} t + C.$$

$x$  айнымалысына қайта оралсақ, ізделінді интегралдың жауабына келеміз:

$$4\sqrt[4]{x} + 2 \ln(1+\sqrt{x}) - 4 \operatorname{arctg} \sqrt[4]{x} + C.$$

**2-жағдай.** Мына түрдегі интеграл астындағы иррационал функцияны тригонометриялық ауыстыруларды қолданып, рационал функцияның интегралына әкелеміз:

$$\int R(x, \sqrt{a^2-x^2}) dx, \quad x = a \sin t;$$

$$\int R(x, \sqrt{a^2+x^2}) dx, \quad x = atgt;$$

$$\int R(x, \sqrt{x^2-a^2}) dx, \quad x = a \sec t.$$

*Мысал 3.*

$$\int \frac{\sqrt{(4-x^2)^3}}{x^6} dx = \left| x = 2 \sin t, dx = 2 \cos t dt \right| = \int \frac{\sqrt{(4-4\sin^2 t)^3}}{64 \sin^6 t} 2 \cos t dt = \frac{1}{4} \int \frac{\cos^4 t}{\sin^6 t} dt = \frac{1}{4} \int \frac{\operatorname{ctg}^4 t}{\sin^2 t} dt =$$

$$= -\frac{1}{4} \int \operatorname{ctg}^4 t dt \operatorname{ctg} t = -\frac{1}{20} \operatorname{ctg}^5 t + C = C - \frac{\sqrt{(4-x^2)^5}}{20 x^5}.$$

**3-жағдай.** Интеграл  $\int \frac{(Ax+B)dx}{(x-\alpha)\sqrt{ax^2+bx+c}}$  интегралын шешу үшін  $x-\alpha = \frac{1}{t}$

белгілеуін енгіземіз.

*Мысал 4.*  $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-2x-1}}$  тап.

Мына белгілеулерді енгізсек  $x = \frac{1}{t}$ ,  $dx = -\frac{dt}{t^2}$ ,  $\sqrt{x^2-2x-1} = \frac{\sqrt{1-2t-t^2}}{t}$ , онда

$$-\int \frac{dt}{\sqrt{2-(t+1)^2}} = -\arcsin \frac{t+1}{\sqrt{2}} + C = -\arcsin \frac{x+1}{\sqrt{2}} + C.$$