

№14-апта.

Тақырыбы: Фурье қатары.

Мысал 1. Периодты $T = 2\pi$ болатын

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x \leq 0 \\ x, & 0 < x < \pi \\ \frac{\pi}{2}, & x = \pi \end{cases} \quad \text{функциясын Фурье қатарына жіктеу керек.}$$

Шешуі: $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 \cdot dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{1}{\pi} \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi}{2};$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cdot \cos nxdx = \left. \begin{array}{l} u = x \\ du = dx \\ dv = \cos nxdx \\ v = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left[x \cdot \frac{1}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{1}{n} \sin nxdx \right] =$$

$$\frac{1}{\pi} \cdot \left(\frac{1}{n^2} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \cdot \left(\frac{1}{n^2} (\cos \pi n - \cos 0) \right) = \frac{\cos \pi n - 1}{\pi n^2};$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin x dx = \left. \begin{array}{l} u = x \\ du = dx \\ dv = \sin nxdx \\ v = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left[-x \cdot \frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \underbrace{\int_0^{\pi} \frac{1}{n} \cos nxdx}_0 \right] =$$

$$\frac{1}{\pi} \left(-\frac{\pi}{n} \cos \pi n \right) = -\frac{\cos \pi n}{n} = \frac{(-1)^{n-1}}{n};$$

Сонымен,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos \pi n - 1}{\pi n^2} \cos nx - \frac{\cos \pi n}{n} \sin nx \right) = \\ &= \frac{\pi}{4} + \left[\left(-\frac{2}{\pi} \cos x + \sin x \right) + \left(-\frac{\sin 2x}{2} \right) + \left(-\frac{2 \cos 3x}{3^2 \pi} + \frac{\sin 3x}{3} \right) + \dots \right] = \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \left(\cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} + \dots \right) + \left(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} + \dots \right) \end{aligned}$$

Жүп және тақ функциялардың Фурье қатары

Жіктеуге жататын $f(x)$ функциясын периодты $T = 2\pi$ деп ұйғарамыз.

1. $f(x)$ функциясы жүп, яғни $f(-x) = f(x)$ деп ұйғарайық.

Онда

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad (n = 0, 1, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

Ал $f(x)$ функциясы жүп болғандықтан $f(x) \cos nx$ көбетіндісі де жүп функция болады.

$$\text{Ендеше } \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = 2 \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

Олай болса

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

Ал $f(x) \sin nx$ көбейтіндісі тақ болады.

$$\text{Онда } \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = 0; \Rightarrow b_n = 0$$

Сонымен, $f(x)$ функциясы жұп болса, Фурье қатары:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

1. $f(x) = \frac{x^2}{4}$ функциясы тақ болсын, яғни $f(-x) = -f(x)$, онда $a_n = 0$ болады да,

$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$, онда тақ функцияның Фурье қатары тек синусы бар қатар ғана болады.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx dx$$

Мысал 6.

Периодты

$T = 2\pi$ болатын

$f(x) = |x|$

функциясын

$$= \frac{-1}{\pi n} (\pi \cos \pi n) = -\frac{\cos \pi n}{n} = \frac{(-1)^{n-1}}{n}; \text{ кесіндісінде Фурье қатарына жікте:}$$

Шешуі: $f(x) = |x|$ - жұп функция, олай болса $b_n = 0$.

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |x| dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{\pi} = \pi;$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |x| \cos nx dx = \left. \begin{array}{l} u = x \\ du = dx \\ dv = \cos n dx \\ v = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{n} x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{1}{n} \sin nx dx \right) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi n^2} ($$

$$f(x) = |x| = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(\cos \pi n - 1)}{\pi n^2} \cos nx = \frac{\pi}{2} + \left(\frac{2 \cdot (-2)}{1^2 \cdot \pi} \cos x + 0 + \frac{2 \cdot (-2)}{3^2 \cdot \pi} \cos 3x + 0 + \frac{2 \cdot (-2)}{5^2 \cdot \pi} \cos 5x + \dots \right) \\ = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left(\frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} + \dots + \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + \dots \right)$$

Кез – келген периодты функцияның Фурье қатары

Мысал 10.

Периодты $T = 2$ болатын $f(x) = x$ функциясын $(-1; 1)$ аралығында Фурье қатарына жіктеу керек болсын.

Шешуі: $f(x) = x$ - тақ функция, $l = 1$. Ендеше, $a_n = 0$; ал

$$b_n = 2 \int_0^1 x \sin \pi n x dx = \left. \begin{array}{l} u = x \\ du = dx \\ dv = \sin \pi n x dx \\ v = -\frac{1}{\pi n} \cos \pi n x \end{array} \right| = 2 \left(-\frac{x}{\pi n} \cos \pi n x \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{\pi n} \cos \pi n x dx \right) =$$
$$= 2 \left(-\frac{1}{\pi n} \cos \pi n + 0 \right) + \frac{1}{\pi^2 n^2} \sin \pi n x \Big|_0^1 = \frac{-2}{\pi n} \cos \pi n = (-1)^{n+1} \frac{2}{\pi n};$$

Олай болса, берілген функцияның Фурье қатары:

$$x = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin \pi n x}{n} = \frac{2}{\pi} \left(\sin \pi x - \frac{\sin 2\pi x}{2} + \frac{\sin 3\pi x}{3} - \dots \right).$$

Мысал 11.

$f(x) = 1 - |x|$ функциясын $(-1;1)$ аралығында Фурье қатарына жіктеу керек болсын.

Шешуі: $f(x) = 1 - |x|$ - жұп функция. Олай болса, $b_n = 0$; ал $l = 1$ және:

$$a_0 = \frac{2}{l} \int_0^1 f(x) dx = 2 \int_0^1 (1 - |x|) dx = 2 \left(x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1 = 1$$

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^1 f(x) \cos \frac{\pi n x}{l} dx = 2 \int_0^1 (1 - x) \cos \pi n x dx = \left. \begin{array}{l} u = 1 - x \\ du = -dx \\ dv = \cos \pi n x dx \\ v = \frac{1}{\pi n} \sin \pi n x \end{array} \right| =$$

$$= 2 \left(\frac{1-x}{\pi n} \sin \pi n x \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{\pi n} \sin \pi n x dx \right) = 2 \left(\frac{1-1}{\pi n} \sin \pi n - \frac{1-0}{\pi n} \sin 0 - \frac{1}{\pi^2 n^2} \cos \pi n x \Big|_0^1 \right) =$$

$$= 2 \left(-\frac{1}{\pi^2 n^2} \cos \pi n + \frac{1}{\pi^2 n^2} \right) = \frac{2}{\pi^2 n^2} (1 - \cos \pi n) = \frac{2}{\pi^2 n^2} (1 - (-1)^n).$$

Ендеше, берілген функцияның Фурье қатары :

$$1 - |x| = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2[1 - (-1)^n]}{\pi^2 n^2} \cos \pi n x = \frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \left(\cos \pi x + \frac{\cos 3\pi x}{3^2} + \dots + \frac{\cos(2n+1)\pi x}{(2n+1)^2} + \dots \right).$$